

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Straße 25, A-4021 Linz Austria  
tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa  
Tel.: (0-22) 832 46 96, fax.: (0-22) 832 46 98

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

**D I C O H E R B 750 SL**

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, mieszankach zbóż jarych.

Zawartość substancji aktywnej:

**MCPA** kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy w formie soli dimetyloaminowej. (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g w 1 litrze środka.

**Zezwolenie MRiRW Nr R- 16 /2006 z dnia 28.04.2006 r.  
zmienione decyzją MRiRW Nr R- 325/2007 z dnia 9.07.2007 r.**

Xn



Działa szkodliwie po połknięciu.  
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.



**Uwaga!**

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

### **DZIAŁANIE NA CHWASTY**

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.

Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

**Chwasty wrażliwe np.:** gorczyca polna, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlec obrotny.

**Chwasty średnio wrażliwe np.:** chaber bławatek, jasnota różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna.

**Chwasty odporne np.:** fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, chwasty rumianowate.

### **ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

#### **Zboża jare:**

##### **jęczmień jary, pszenica jara, owies**

-Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

Opryskiwać wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

##### **mieszanki zbóż jarych.**

-Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.

Opryskiwać wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia.

#### **Zboża ozime:**

##### **pszenica ozima, pszenżyto ozime.**

Opryskiwać jesienią lub wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

-Zalecana dawka: 1 l/ha.

Do równoczesnego zwalczania chwastów i zapobiegania wyleganiu pszenicy Dicoherb 750 SL można stosować łącznie ze środkiem Stabilan 750 SL

#### **pszenica ozima**

Zabieg wykonać po zakończeniu fazy krzewienia, lecz nie później niż na początku fazy strzelania w źdźbło.

odmiany skłonne do wylegania.

Dicoherb 750 SL 1 l/ha + Stabilan 750 SL 2 l/ha.

odmiany mniej podatne na wyleganie:

Dicoherb 750 SL 1 l/ha + Stabilan 750 SL 1,2 l/ha.

**Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.**

**Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.**

### **NASTĘPSTWO ROŚLIN**

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsięwziętej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

**OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

**OKRES KARENCJI** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): **NIE DOTYCZY**

### **PRZECIWWSKAZANIA**

Środka nie stosować:

1. na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone.
2. w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.
3. w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C
4. w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

## **PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

## **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

**Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....