

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:** OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Włochy, tel.: ++39 (0) 235 378 1, fax: ++39 (0) 233 90 275, e- mail: [oxon@oxon.it](mailto:oxon@oxon.it)  
**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**  
**KAZGOD Sp. z o.o.**, ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie,  
tel./fax: (0-prefiks-22) 725 38 93, e-mail: [kazgod@kazgod.com.pl](mailto:kazgod@kazgod.com.pl)

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**


## M I C E X A N I L 76 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Zawartość substancji aktywnych:

<b>cymoksanil</b> 1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik	związek z grupy iminoacetylomoczników	-	<b>6 %</b> ,
<b>mankozeb</b> (kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku)	związek z grupy ditiokarbaminianów	-	<b>70 %</b> .

**Zezwolenie MR i RW Nr R-51/2007 z dnia 20.12.2007 r.**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## **ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **Rośliny rolnicze**

#### **ziemniak.**

- zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem Micexanil 76 WP następne zabiegi wykonywać innymi środkami o działaniu systemicznym w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

**OKRES KARENCJI** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): ziemniak - 11 dni.

**OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

**PRZECHOWYWANIE**

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

**WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

**UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

**Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58)349-28-31  
Kraków - (0-12)683-11-34  
Lublin – (0-81)740-89-83  
Łódź – (0-42)657-99-00  
Poznań – (0-61)847-69-46

Rzeszów – (0-17)866-44-09  
Sosnowiec – (0-32)266-11-45  
Tarnów – (0-14)629-95-88  
Warszawa – (0-22)619-66-54  
Wrocław – (0-71)343-30-08

Okres ważności – 2 lata  
Data produkcji - .....  
Zawartość netto - .....  
Nr partii - .....