

**Producent:** Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Building 5-2,  
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokio 100-0005, Japonia,  
**Importer:** Kazgod Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie,  
tel/fax: (0-prefix-22) 725 38 93, e-mail: kazgod@kazgod.com.pl

## P Y R A N I C A 2 0 W P

Środek przedziorkobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przedziorków w roślinach warzywnych pod osłonami.  
Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:  
tebufenpyrad (związek z grupy pochodnych pyrazoli) - 20%.

**Zezwolenie MRiGŻ Nr 402/98 z dnia 28.09.1998r.**  
**Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 45/2004p z dnia 23.01.2004r.**  
**oraz decyzją MRiRW Nr R - 208/2004o z dnia 26.04.2004 r.**

### Określenie toksyczności:

dla ludzi - **szkodliwy**  
dla organizmów wodnych - **bardzo toksyczny**.



(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.

(R36) Działa drażniąco na oczy.

(R50) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.



### Uwaga:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

**ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **Rośliny warzywne (pod osłonami)**

**- ogórek, pomidor, papryka, oherżyna.**

-przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec.

-Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).

Opryskiwać po zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.

### **UWAGA**

Opryskiwać dokładnie rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

**KARENCA** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

ogórek, pomidor, papryka, oherżyna - 2 dni.

**OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

**OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wleaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **PRZECHOWYWANIE**

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0° - 30° C.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

### **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

### **Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16  
44 09

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99  
45

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....